

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 26

FRUTOS SECOS

Almendro


Plagas

ÁCAROS

En el cultivo situado por debajo de 600 m de altitud, se observa la presencia de ácaros en el 25-30% de las parcelas muestreadas, sin que aumente ese porcentaje. Sin embargo, se aprecia un incremento de hojas afectadas en aquellas parcelas donde la plaga está presente, aunque en ningún caso se supera el 20%.

ANARSIA

Los niveles medios de capturas se mantienen en torno a los 27 adultos por trampa y semana en las parcelas situadas a menor altitud. Por el contrario, en las últimas dos semanas y en las parcelas situadas por encima de los 600 metros se ha producido un incremento de las capturas que ya se sitúan entre los 45 y 50 adultos por trampa y semana en las más elevadas. Pese a todo lo anterior, el porcentaje de brotes afectados se mantiene muy bajo en todas las zonas y no se observa daño reciente alguno en los frutos.



MOSQUITO VERDE

Las poblaciones de esta plaga se mantienen o suben ligeramente, puesto que actualmente ocupan el 5-6% de los brotes de los almendros de las zonas bajas y cifras ligeramente menores en las parcelas más altas.

Enfermedades

MANCHA OCRE

Los daños comenzaron a observarse durante la semana 23, entre el 3 y el 9 de junio. En las zonas bajas el porcentaje de hojas afectadas ronda el 8-9 % desde la semana 24 y se mantienen prácticamente constantes en las últimas semanas. En las parcelas situadas por encima de los 600m., la tendencia es creciente, particularmente en la última semana, ya que el porcentaje de hojas afectadas supone actualmente casi el 15%.

