

**RedFAra**

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 29

CULTIVOS EXTENSIVOS

FORRAJERAS - ALFALFA

A pocos días de realizar el tercer corte en el cultivo de la alfalfa y en pleno mes de julio la ausencia de plagas en el cultivo es la nota predominante en todo Aragón con algún pequeño foco de pulgón en zonas de Sariñena o Almudevar como lo único destacable.

GIRASOL

En las parcelas de girasol se comienza a diferenciar el capítulo floral con todas las capturas de plagas (gusano alambre, Heliothis y rosquilla) a cero.

ARROZ

El cultivo del arroz se encuentra en el estado fenológico de pleno ahijado en la mayor parte de los arrozales de Aragón, con capturas de plagas en niveles muy bajos de Chilo, por debajo de 10 individuos por trampa, y el resto de plagas sin presencia.

No se tiene constancia de presencia de Piricularia en ninguna parcela de seguimiento.

MAÍZ

El cultivo se encuentra en inicio de salida del penacho en todas aquellas parcelas que se sembraron en mayo. En la semana 29 en mitad del mes de julio los niveles de capturas son muy inferiores a los detectados en las mismas fechas en años anteriores.

En el caso de ***Heliothis***, existe presencia y capturas en todas las zonas de maíz de Aragón, con algún pequeño repunte en la zona del Valle del Ebro con 250 capturas en esta semana. Todas las demás zonas están muy por debajo de las 100 capturas.

La plaga ***Mythinma***, las capturas son mínimas por debajo de los 10 adultos por trampa y semana.

Las capturas de ***Sesamia*** y ***Ostrinia*** son cercanas a cero siendo en muchos casos incluso cero, solamente existe constancia de capturas en la zona cercana a Zaragoza con 30 individuos por trampa y semana.