

**RedFAra**

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 37

CULTIVOS EXTENSIVOS

FORRAJERAS - ALFALFA

Con el cuarto corte ya realizado en todas las zonas de seguimiento, la semana 37 se caracteriza por la poca presencia de plagas en el cultivo de la alfalfa. La captura de orugas ha sido generalizada por todas las zonas, como son Monegros, Bajo Aragón, Ribera del Ebro y Hoya de Huesca con 2 capturas de dicha plaga por pase de manga.


Sigue habiendo presencia de pulgón en las parcelas de alfalfa con 36 capturas en puntos del Bajo Aragón y 10 en la Ribera Baja del Ebro.

GIRASOL

El cultivo se encuentra en el estado fenológico de semillas en color negro y duras, cercanas a la recolección. Presencia de *Heliothis* en la zona centro de la provincia de Huesca con 4 capturas.

ARROZ

El cultivo se encuentra en el estado fenológico de grano pastoso blando. Tras las capturas de Chilo en las últimas semanas se empiezan a ver daños en el cultivo, llegando a contabilizar en la zona de Monegros 14 larvas por muestra realizada, con un 5% de plantas. En la zona de Cinco Villas no se han detectado plantas afectadas, aunque sigue habiendo capturas con 8 individuos por trampa.



Grafica de adultos de Chilo


1% de hojas y cuello afectado en las plantas de arroz por Piricularia en la zona de Monegros.

MAÍZ


Con el final del verano el cultivo está en el estado fenológico de grano pastoso en algunas zonas y semiduro en otras.

En la semana 37, en todas las zonas de maíz se tiene constancia de la presencia de plagas. En el caso de **Heliothis**, los mayores números de capturas se sitúan en la provincia de Huesca, con 168 individuos en la zona de Grañen y a diferencia de semanas pasadas también en la provincia de Zaragoza ha hecho presencia esta plaga, llegando a tener 65 capturas en la zona de la Ribera del Ebro.

Sesamia ha tenido importancia en la zona de Monegros con entre 15 y 20% de plantas afectadas en la parcela de muestreo. En la zona de la Ribera Alta del Ebro las capturas han estado en torno a 40 adultos por trampa.




Grafica de capturas de Sesamia



Grafica de plantas afectadas por Sesamia

Tetranychus Urticae. la araña roja del maíz, ha empezado a disminuir en las dos últimas semanas su presencia en las plantas de maíz respecto a semanas pasadas con datos de menos de 10 individuos de esta plaga por hoja, ocupando casi la totalidad de las hojas de la planta.



Gráfica individuos de Tetranychus Urticae