



RedFara

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 43

CULTIVOS EXTENSIVOS

En la semana 43 el otoño se ha hecho presente en el campo aragonés con una ligera bajada de las temperaturas y la llegada de las primeras lluvias de forma generalizada por todo el territorio lo que ha mejorado las previsiones de siembra. Se ha disminuido la presencia de plagas en todos los cultivos.


FORRAJERAS - ALFALFA

Esperando a realizar el último corte en la mayoría de las zonas de alfalfa de Aragón, que en muchos casos será el sexto de la campaña.


Una semana más se siguen encontrando plantas afectadas por la pulguilla (*Sminthurus viridis*), con daños en parcelas del 5% como es la zona de Sariñena y Ribera del Ebro.

Los pulgones de la alfalfa se han encontrado en la mayoría de las zonas de seguimiento, con 12 capturas por pase de manga en la zona de Cinco Villas. 11 en Monegros o 13 en la zona de la Hoya de Huesca y zona de Barbastro.


Encontrados pequeños focos de Apion en la zona de las Cinco Villas, con 4 capturas por pase de manga.




Grafica pulgones por pase de manga




Grafica pulgones por pase de manga



Grafica pulgones por pase de manga



Grafica pulgones por pase de manga



Grafica pulgones por pase de manga

El resto de capturas sigue a cero. **Se debe recordar que para realizar un control integrado de las plagas, especialmente al gusano verde, para la nueva campaña 2020, algunos de los métodos que se recomiendan realizar en estas fechas son retrasar del último corte, y realizar el pastoreo de las parcelas en invierno o realizar el pase de cuchilla niveladora antes de salida del invierno.**

ARROZ

En la semana 43 algunas parcelas se han empezado a recolectar, pero con las lluvias se está ralentizando la cosecha.

Todas las plagas siguen a cero y se da por finalizada el seguimiento en el arroz.

MAÍZ


En la semana 43 el cultivo de maíz se encuentra en el estado de planta seca en las parcelas de primera cosecha y grano semiduro en las de segunda cosecha.

En todas las zonas maiceras ya se ha generalizado la recolección del cultivo, aunque en con paradas intermitentes motivadas por las últimas lluvias.


Se pueden encontrar en torno al 10% de plantas afectadas por *Heliothis* en la zona de Barbastro y el Bajo Aragón.

En la semana 43 las capturas del resto de plagas, *Sesamia*, *Ostrinia*, *Mythinma* y Acaros, es cero.


Heliothis:




Grafica capturas de Heliothis



Grafica de plantas afectadas por Heliothis




Grafica capturas de Heliothis




Grafica de plantas afectadas por Heliothis


Sesamia:




Grafica capturas de Sesamia



Grafica de plantas afectadas por Sesamia



Grafica capturas de Sesamia



Grafica de plantas afectadas por Sesamia