RedFAra

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 8

Febrero de 2020

CULTIVOS EXTENSIVOS

La ausencia de precipitaciones y aumento de las temperaturas son los factores que propician que algunas parcelas concretas el cereal de invierno se encuentren en el inicio del encañado. Aumento de las incidencias de *Helminthosporium* en algunas zonas de Aragón y primeros ataques de *Rincosporium.*

CEREAL DE INVIERNO

En la tercera semana de febrero se pueden encontrar parcelas de cereal de invierno desde el estado de 3 hojas, corresponden a las siembras del mes de enero, y parcelas de pleno ahijado e incluso inicio de encañado en siembras más tempranas.

Al igual que las semanas pasadas, se sigue encontrando síntomas de presencia de Helminthosporium en parcelas de cebada situadas por todas las zonas de Aragón, ya sea por el Somontano de Barbastro, Monegros, Cinco Villas, zona de Teruel y la Ribera del Ebro desde Mallen hasta Caspe. Con incidencias que van desde el 10 % de las plantas afectadas hasta el 80% en algunas parcelas. Además, se empiezan a encontrar los primeros síntomas de Rincosporium en parcelas de cebada, con valores en torno al 10% de las plantas afectadas.



Afecciones de Rincosporium

No existen indicios de existencia del resto de plagas en los cereales de invierno.

LEGUMINOSAS - GUISANTE

Las parcelas de seguimiento situadas en Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Hoya de Huesca se encuentran en estado fenológico entre seis hojas desplegadas y primer entrenudo.

Se siguen encontrando parcelas con síntomas de Antracnosis, con valores de incidencia en torno al 10% en las zonas de Cinco Villas y Hoya de Huesca.

COLZA

Las parcelas de colza pertenecientes a la Red se encuentran en el estado de “botón verde”. No se tiene constancia de plagas ni enfermedades en el punto de seguimiento.

ALFALFA

Con las temperaturas suaves del mes de febrero el cultivo de la alfalfa sigue su crecimiento, encontrando capturas de Apion y Gusano verde en los pases de manga, con valores por debajo de 5 capturas. En algunas zonas se siguen encontrando individuos de pulguilla, Sminthurus *viridis.*

Parcela de alfalfa en regadío por aspersión