

## Red Fitosanitaria de Aragón

### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 15


#### FRUTOS SECOS

## Almendro

### Enfermedades

#### CRIBADO

Se observa un aumento continuado de esta enfermedad a lo largo de las semanas. Así, en el caso de las hojas tal y como se indica en la gráfica adjunta, desde la semana 13 el porcentaje de puntos afectados ha ascendido de un 20% a un 84,6% en la semana 15. El porcentaje medio de daños también ha presentado un crecimiento, situándose en un 8,8% de hojas afectadas durante la pasada semana.



Los frutos presentan la misma tendencia, de manera que durante la semana 14 se observaron daños en un 10% de las parcelas muestreadas mientras que en la semana 15 se ha pasado a tener afección en un 38,5% de los puntos monitorizados. El porcentaje medio de daños en fruto en esta última semana ha sido del 8,8%. Es conveniente continuar protegiendo el cultivo contra esta enfermedad mientras las condiciones climáticas sean propicias para su propagación.

#### MONILIA

Al igual que en informes anteriores, los daños causados por esta enfermedad continúan siendo muy bajos, siendo en todos los casos inferiores a un 3% de flores momificadas. Tan solo se han observado afecciones por monilia en cuatro de las veintiuna parcelas monitorizadas de la Red.

## **Plagas**

### **ANARSIA**

Durante la semana 15, se han encontrado capturas en cuatro de las veintisiete parcelas monitorizadas con una media de 1,3 adultos por trampa, lo que supone una leve disminución en las medias frente a los 1,5 adultos de la semana 13. En cuanto a los daños, solamente se observó afección en un 7,4% de las parcelas, con un 3% de brotes dañados de media en las mismas.

### **PULGÓN**

El porcentaje de parcelas en las que podemos encontrar este áfido ha aumentado levemente de la semana 13 a la 15 pasando de un 25% a un 28,6%. Al igual que el porcentaje medio de ocupación en las mismas, que ha pasado de un 1,5% a un 1,9%.

Zaragoza, 13 de abril de 2020