

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 13

VIÑEDO

1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO

En Cariñena durante la semana 12 cerca del 60% de los puntos de Red se encuentran todavía en los estados B2 y B3 de yema hinchada. Aunque el 30% de estos puntos ya están en brotación más del 8%, con una hoja separada. Durante la semana 13 evolucionamos con 28% de puntos en brotación, un 16% en hojas incipientes y un 20% en hoja extendida (1 y 2 hojas separadas).

Mientras en Borja en semana 12, los puntos de Red se encuentran con el 40% de ellos en yema hinchada y otro 40% en punta verde, el resto en brotación. En la semana siguiente el avance ha sido lento en las que estaban todavía en estado yema hinchada, sin embargo las que estaban en brotación ya han avanzado a hojas extendidas con 1 y 2 hojas separadas.

En Maella se encuentran en estado D de hojas incipientes, así en Calatayud todavía se encuentran en apertura de escamas de la yema.




Ilustración 1 Distribución fenológica por zonas.

Por el momento no hay incidencias destacables en cuanto a Plagas o enfermedades en los viñedos de la Red.

Zaragoza, a 5 mayo de 2020