

## Red Fitosanitaria de Aragón

### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 17

#### VIÑEDO

### 1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO

Desde campo de Cariñena tenemos el 38% de los puntos de Red entre los estados E1 y E4 con hojas extendidas de una a cuatro separadas, mientras que otro 54% se encuentran ya entre F5 y F7 con pámpanos visibles y 7 hojas separadas. Ya hay un 8 % de puntos que más precoces que están en estado G8-G9, en Longares.

Tanto en el punto de Red de Maella como en el de Barbastro, nos encontramos en E4 con cuatro hojas separadas.

En el Campo de Borja las viñas están repartidas con un 27% de los puntos de Red en estadios comprendidos entre E1 y el E4, y el 73% los encontramos entre los estados F5 a F7 aunque más de la mitad se encuentran con 5 hojas separadas.

En la zona de Calatayud todos sus puntos se encuentran en hojas extendidas (E) con tres hojas separadas en los puntos de Cervera de la Cañada y con una y dos hojas separadas en Miedes.




Ilustración 1 Estado Fenológico por Zonas semana 17

## **2. PRINCIPALES PLAGAS**

### **A. Polilla del racimo**

Tan solo en el campo de Cariñena han sido capturadas 0.29 adultos / trampa y día en un punto, y en Maella donde se han capturado 0.84 adultos/trampa y día.

## **3. PRINCIPALES ENFERMEDADES**

### **A. Oídio**

Se han localizado algunos brotes de Oidio en la Comarca pero solo un punto de Red registra afecciones considerables, con un 10% de hojas afectadas

### **B. Mildiu**

Aunque en algunos puntos se ha cumplido el 100% del acumulado no se han observado en los puntos de Red

Zaragoza, a 5 mayo de 2020