

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 33-34

Agosto de 2020

CULTIVOS EXTENSIVOS

CEREAL DE PRIMAVERA

ARROZ


Fenología

Es el mes de agosto, con las altas temperaturas, cuando el cultivo del arroz comienza su floración, encontrando tradicionalmente diferencias en el estado del cultivo entre las parcelas situadas en la provincia de Huesca y la de Zaragoza. El cultivo situado en Monegros y zona del Cinca ya se encuentra en plena floración mientras que el situado en Cinco Villas está comenzando el espigado.



Plagas

Descenso generalizado en todas las parcelas de seguimiento en cuanto a capturas de *Chilo suppressalis*, capturas por debajo de los 10 individuos por trampa y semana en las zonas de Monegros y Cinca Medio y 33 individuos en parcelas de Cinco Villas. Del resto de plagas no se tiene constancia.



Evolución de capturas de Chilo en la zona del Cinca

A diferencia de otros años, hasta el momento la Piricularia (*Pyricularia oryzae*) no está causando problemas en el cultivo, a pesar de ello se han realizado tratamientos en parcelas de forma preventiva. Se recuerda que las condiciones favorables para el desarrollo de esta enfermedad son temperaturas medias entre 15°C y 28°C, además de humedad relativa media superior al 93% durante más de 10 horas seguidas.

MAÍZ

Fenología

La mayoría de las parcelas de seguimiento de maíz se encuentran en el estado de grano lechoso y grano patoso, el cultivo sigue teniendo condiciones favorables para su desarrollo.

Plagas

Con los focos de *Mythimna* ya controlados, es *Heliothis* la plaga de la que más capturas se está teniendo, con capturas de 150-200 individuos por trampa y semana en Monegros, 80-190 en la Ribera Alta del Ebro y 50 en Cinco Villas.

Es en las últimas semanas cuando se ha empezado a tener constancia de Araña Roja (*Tetranychus Urticae*), en el cultivo de maíz. A diferencia de otros años, esta plaga se ha presentado más tarde en el tiempo y sin ocasionar grandes incidencias hasta el momento. Es en la zona de la Hoya de Huesca y Monegros donde más individuos por hoja se están contabilizando, con 10 individuos por hoja.

FORRAJERAS

ALFALFA

Fenología

Con el 4º corte ya realizado en muchas zonas de Aragón, es el cultivo de la alfalfa una alternativa a otros cultivos ante el control de plagas y enfermedades.

Plagas

Siguen siendo los pulgones las únicas plagas con capturas significativas en las parcelas de seguimiento de alfalfa, con índices inferiores a semanas pasadas, todos ellos por debajo de 10 individuos por pase de manga.

OLEAGINOSAS

GIRASOL

Fenología

Es en las parcelas situadas en Cinco Villas donde se está llegando a madurez total de la planta, mientras que en las parcelas de seguimiento de la provincia de Teruel comienzan a adquirir tonos negros, característicos del inicio de madurez.



Plagas

Niveles bajos de capturas de *Heliothis* en parcelas de Cinco Villas, 6 adultos por trampa y semana, es la única plaga contabilizada en las últimas semanas en el cultivo del girasol.