



## Red Fitosanitaria de Aragón

### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 37

Septiembre de 2020

### CULTIVOS EXTENSIVOS

En el maíz destaca el repunte en las capturas de *Heliothis (Helicoverpa armigera)* y niveles altos de Araña roja (*Tetranychus Urticae*) sin llegar a ser preocupantes para el cultivo. Bajada de capturas de Chilo (*Chilo Suppressalis*) y baja incidencia de *Pyricularia (Pyricularia oryzae)* en el cultivo del arroz, y ausencia de plagas significativas en alfalfa que encara los últimos cortes.

#### CEREAL DE PRIMAVERA

#### ARROZ

##### Fenología

Se observa diferencias en los estados fenológicos en las dos zonas arroceras de Aragón. Desde grano patoso- lechoso en las parcelas situadas en la provincia de Huesca, mientras que en las situadas en Cinco Villas el cultivo se encuentra en plena floración.

##### Plagas

Disminución en el número de capturas de CHILO (*Chilo suppressalis*) en las parcelas de seguimiento, todas ellas por debajo de 20 individuos por trampa y semana.

##### Enfermedades

Con las altas temperaturas y humedades registradas durante el mes de agosto y las dos primeras semanas del mes de septiembre, las parcelas de arroz situadas en la provincia de Huesca (Monegros y Bajo Cinca) se encuentran con porcentajes de PYRICULARIA (*Pyricularia oryzae*) cercanos al 10% de espigas afectadas y 5 % de los granos manchados. En las parcelas de seguimiento situadas en Cinco Villas no

presentan daños de esta enfermedad. El cambio a temperaturas mas frescas y la presencia de cierzo han paralizado su incidencia.



Panícula de arroz afectada por *Pyricularia*

## MAÍZ

### Fenología

Comienzan a verse las primeras mazorcas de maíz con el grano semiduro y plantas secas casi en su totalidad. Ya nos acercamos a la recolección de las variedades de siembras más tempranas.



detalle mazorca

### Plagas

Parcelas con repuntes en el número de capturas de HELIOTIS (*Helicoverpa armigera*) que han llegado a afectar al 25% de las plantas de las parcelas de seguimiento de la zona de Monegros. Todavía las capturas en la zona de Ribera Alta del Ebro están por encima de los 100 adultos por trampa y semana. Los daños ocasionados por *Mythinma* en la zona de Monegros y Bajo Aragón (alcañiz) también

son puntualmente altos en algunas parcelas, con el 50% de las plantas afectadas. Del resto de orugas no se tiene constancia significativa.

Con las altas temperaturas asentadas en las últimas semanas, la cantidad de Araña Roja (*Tetranychus Urticae*) se mantiene alto en gran parte de las parcelas de maíz, aunque si es verdad que con el estado fenológico en el cual se encuentra el cultivo ya no ocasiona grandes problemas para este. Niveles por encima de los 40 individuos de araña roja por hoja en parcelas de Cinco Villas y Monegros.

## **FORRAJERAS**

### **ALFALFA**

#### **Fenología**

Con el sexto corte realizado en algunas zonas de Aragón, la mayoría se encuentran en el quinto corte, con niveles bajos de plagas encontradas, solamente cabe destacar parcelas muy puntuales con pulgones negros que no afectan a la producción de alfalfa.