EFICACIA DE DIFERENTES SUSTANCIAS EN EL CONTROL QUÍMICO DE LA PODREDUMBRE GRIS (*Botrytis* spp.)

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Objetivo

Valorar la eficacia de cuatro tratamientos de diferentes formulados en el control de *Botrytis* spp.

Especie y variedad

Vid, Garnacha.

Esquema del ensayo

Parcela elemental 9 cepas con 4 repeticiones

Tesis estudiadas

1.- (Tto.2) *Bacillus amyloliquefaciens* 25% WG
2.- (Tto.2) eugenol 3,3% + geraniol 6,6% + timol 6,6% CS
3.- (Tto.2) ciprodinil 37% + fludioxinil 25% WG
4.- (Tto.2) fenpirazamina 50% WG
5.- (Tto.2) fluopyram 50% SC
6.- (Tto.2) fenhexamida 50% WG
7.- (Tto.2) fludioxinil 50% WG
8.- (Tto.2) ciprodinil 30% EC
9.- (Tto.1) ciprodinil 30%EC y (Tto.2) ciprodinil 30%EC
10.- (Tto.1) ciprodinil 30% y (Tto.2) fluopyram 50% SC
11.- Testigo (sin tratamiento)

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Controles

Se contabilizaron los racimos afectados y la afección en % de cada racimo, clasificados en tres categorías: Entre 1 y 20%, entre el 20 y el 50%, mayor de 51%.

Se observaron todos los racimos, de 7 cepas de cada parcela elemental

Fechas de tratamientos

- (Tto. 1) 9 de septiembre de 2020
- (Tto. 2) 30 de septiembre de 2020

Fecha de control

- 15 de octubre de 2020

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados

El producto que mejor resultó ciprodinil 30% con dos tratamientos, también fueron efectivos los tratamientos únicos de ciprodinil 30% y fludioxinil 50%. La combinación de eugenol 3,3%+geraniol 6,6%+timol 6,6% resultó eficaz.