VALORACIÓN DE MATERIAS QUÍMICAS EN EL CONTROL DE *Monilinia* y *Rhizopus* EN NECTARINA

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Objetivo	Estudiar qué materia activa presenta mejores resultados en la lucha contra Monilinia y Rhizopus
Especie y variedad	Nectarina Queen Glory
Esquema del ensayo	Parcela elemental de 3 árboles con 3 repeticiones
Tesis estudiadas	Fluopyram 50% SC Pentiopirad 20% SC Fenpirazamina 50% WG Piraclostrobin 6,7% + Boscalida 26,7% WG Ciprodinil 37,5 + Fludioxonil 25% WG *Saccharomyces cerevisiae* 96,1% WG Testigo (sin tratamiento)

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Controles

Se contabilizan frutos afectados
188 frutos por tesis

Fechas de tratamientos

- 16 de julio de 2020
- 23 de julio de 2020

Fechas de controles

- 30 de julio de 2020 (recolección)
- 06 de agosto de 2020 (cámara a 5ºC)

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados

Las tesis que mejor han controlado la monilia han sido fluopyram 50% SC, pentiopirad 20% SC, boscalida 26,7% + piraclostrobin 6,7% WG y ciprodinil 37,5% + fludioxonil 25% WG en este orden frente al resto de tesis y testigo.



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados

La tesis que mejor ha controlado el rhizopus ha sido el fluopyram 50% SC