

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 24/2021

HORTICOLAS

CEBOLLA

Fenología

En las primeras semanas del mes de junio, el cultivo de la cebolla se encuentra en el estado fenológico de “inicio de formación del bulbo”, en parcelas de seguimiento situadas en la Ribera del Ebro.

Plagas

No hay incidencias destacables en el cultivo respecto a las plagas que le pueden afectar, solamente se observan Trips, encontrándose en el 100% de las plantas sin presentar daños destacables en el cultivo.

Malas hierbas



Los tratamientos herbicidas y las escardas manuales realizados en mayo en las parcelas de cebolla pertenecientes a la Red hacen que las coberturas de malas hierbas se mantengan en valores inferiores o cercanos al 5%. Podemos encontrar especies como *Convolvulus arvensis* (correhuela) o algunas especies de amarillera.

Cultivo de cebolla con varias plantas de correhuela y amarillera

TOMATE

Fenología

En las parcelas de seguimiento del cultivo de tomate situadas en Cinco Villas y Ribera del Ebro, las plantas se encuentran en estado fenológico de 6 hojas e inicio de brotes laterales, crecimiento favorecido por las altas temperaturas del mes de junio.

Plagas

Solamente se encuentra algún individuo de pulgón en las parcelas de seguimiento, estando presente solamente en el 2% de las plantas, ausencia del resto de plagas en el cultivo de tomate.

Malas hierbas



Aspecto del tamaño de las tomateras con elevada infestación de juncia.

Encontramos parcelas de tomate para transformación pertenecientes a la Red libres de malas hierbas, otras presentan coberturas inferiores o iguales al 5%.

Una de las especies más frecuente y problemática es el *Cyperus rotundus*, (juncia). En estos momentos, el cultivo está poco desarrollado, por lo que no es capaz de competir adecuadamente con esta especie que crece y se desarrolla rápidamente si no tiene competencia por la luz.

Podemos encontrar otras especies típicas de ciclo de verano como *Portulaca oleracea* (verdolaga), *Solanum nigrum* (tomatito) y algunas especies de gramíneas como la *Setaria* spp. (lapa) o *Cynodon dactylon* (grama).

PATATA

Fenología

El cultivo de la patata, las plantas se encuentran en crecimiento longitudinal.

Plagas

Primeras capturas de Escarabajo de la patata en las parcelas de seguimiento, con 3 adultos en la zona de Villarquemado y 1 en Cella.



PUERRO

Fenología

Parcelas situadas en Cinco Villas destinadas a la industria conservera, el estado fenológico de este cultivo es de nacencia, favorecido por las temperaturas.