

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 30

Viñedo

Tras un periodo de temperaturas suaves, seguido de unos días de intenso calor, se ha vuelto a la bajada de temperaturas, lo que en algunas viñas más adelantadas hizo comenzar el envero, viéndose de nuevo pausado por las temperaturas inferiores. La escasez de lluvias durante ya un prolongado periodo de tiempo, junto con inicios de envero, está empezando a generar cierto estrés sobre las vides, sobretodo en las de secano.

Fenología

En esta semana 30, podemos observar que algunas viñas que iniciaron en la semana 29 envero han progresado. Iniciando el mes de agosto, tenemos aproximadamente el 75% de la superficie de Red sin haber iniciado el envero. Cabe destacar la zona de Campo de Borja, en que de los puntos prospectados en esta semana 30 tan sólo uno había comenzado el envero; sin embargo, Calatayud sigue un calendario similar a otras campañas.

Semana	Zona				
		L. Cerramiento de Racimo.	M1. 10% Inicio de envero.	M1. 25% Inicio envero.	M2. 50% Pleno envero.
30	Cariñena	60.9%	30.4%		8.7%
	Borja	85.7%	14.3%		
	Calatayud	75%	25%		
	Maella			100%	

OIDIO

En las revisiones de los puntos de Red, en la semana 30 han mostrado diferentes evoluciones según comarcas. En Cariñena tan solo en 3 de los 26 puntos prospectados, se detectaron afecciones importantes de este hongo, cuyos porcentajes de daños están entre el 21-75% de los racimos.

En la comarca Campo de Borja, en 3 de los 7 puntos inspeccionados esta semana se han detectado síntomas de oídio en sus racimos, aunque de escasa importancia. De la misma forma en Calatayud 2 de los 4 puntos indican afección por oídio, pero de apenas un 1-2% de los racimos.

PIRAL

De los puntos de Red inspeccionados en Cariñena, en 4 de ellos se contabilizaron capturas de Piral, los valores de estas están entre 0.57 y 3.83 adultos por trampa y día, este último dato recogido en zona de Longares. En Borja, se han recogido capturas en 4 de los 7 puntos prospectados en esta semana, los valores han sido menores, de 0.42 a 1.28 adultos por trampa y día. En Calatayud, son 4 los puntos que registran capturas, los valores están entre 0.14 a 0.71 adultos por trampa y día.

POLILLA DE RACIMO

Tan solo en el punto de Maella se han registrado capturas de esta polilla, y con valores altos de 6.18 adultos por trampa y día.

Zaragoza, 03 de agosto de 2021