



## Red Fitosanitaria de Aragón

### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 30

#### Olivar

##### Fenología

El estado fenológico generalizado en los puntos de la Red, está siendo el H endurecimiento de hueso, tan sólo un punto en Campo de Borja permanece en G Fruto cuajado.

##### Plagas

###### **ABICHADO** *Euzophera pingüis*

El número de galerías activas detectado en esta semana en Bajo Aragón, está siendo bajo siendo aproximadamente 5% de los árboles. En la zona de Caspe no se detectan galerías activas.

###### **BARRENILLO ( Salida)** *Phaeotribus scarabeoides*

En uno de los 3 puntos de Red de Bajo Aragón que controla este barrenillo, ha contabilizado 312 salidas de adultos en esta semana, sin embargo, en los otros dos puntos apenas ha habido salidas. De misma manera en Caspe de los puntos de Red que inspeccionan esta plaga, la mitad ha detectado un número alto de salidas 174, y la otra mitad muy bajo 10. El número de salidas en Somontano se reduce a 16 salidas de adultos.

###### **COCHINILLA** *Saissetia oleae*

En Matarraña continua en esta semana con una media de 15% de hembras que ya han eclosionado todos sus huevos.

###### **MOSCA DEL OLIVO** *Bactrocera oleae*

En el Bajo Aragón 43% de sus puntos de Red registran capturas entre 2 y 3 moscas al día. Las afecciones en fruto se contabilizan en estos puntos, están entre 1.3 y 2% de los frutos. También se registra afección en fruto, inferior a 1%, en el 21% de los puntos siendo sus capturas inferiores a 0.5 moscas al día. En las olivas picadas se encuentra mosca en forma de huevo, larva L1 y L2, aunque la mayor parte está en L1.

En Caspe, las capturas esta semana han sido muy bajas, entre 0.09 y 0.41 adultos por día. Tan solo dos puntos han detectado daños en fruto, uno con apenas el 1%, el otro con 3.83% de

los frutos dañados, en estos se observa que la mayoría está en fase larvaria L1, quedando algunos en estado de huevo.

En Somontano las capturas de esta semana en sus puntos de Red han estado entre 0.19 y 1.47 adultos por día, pero no ha habido registro de daños en oliva.

En Valdejalón apenas ha habido capturas, así como en Belchite donde también han sido bajas, apenas 0.6 adultos por día, aunque en este punto se han detectado picada en fruto que supone el 1% del total.

En Borja, de los dos puntos controlados, uno no alcanza las 0.6 adultos por día y el otro punto está cercano a las 3. Los valores de capturas de mosca no están siendo homogéneos dentro de las zonas.