



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 15

12 de abril de 2022

CULTIVOS EXTENSIVOS

CEREAL DE INVIERNO

Fenología

Las bajas temperaturas, por debajo de los cero grados, de las últimas semanas no han afectado a los cereales de invierno ya que todavía no se encontraban en floración en ninguna de las zonas de Aragón. Comienzan a verse las primeras parcelas de cebada en el estado de “Ígula de la última hoja visible”, el resto de los cereales se encuentra en la mayoría de las zonas entre final de ahijado y formación de segundo nudo.



Plagas

Helminthosporium y *Rincosporiosis* son las incidencias que se están dando en parcelas de cebada, concretamente las mayores incidencias se encuentran en parcelas de Monegros, Somontano de Barbastro y Hoy de Huesca, niveles todos ellos que hasta el momento no llegan a los umbrales de tratamiento

Septoriosis es la única incidencia que se aprecia en parcelas de trigo, parcelas del Somontano de Barbastro con incidencias del 18% de plantas afectadas. Del resto de plagas como puede ser Roya amarilla no se tiene constancia en Aragón.

OLEAGINOSAS

COLZA

Fenología

Plantas al inicio de floración que apenas les ha afectado las bajas temperaturas de las últimas semanas. Parcelas del Bajo Aragón con el 50% de flores abiertas.

Plagas

Presencia de pulgones en parcelas de colza de las zonas de Jacetania y Bajo Aragón. Hasta la fecha es la única plaga encontrada en las parcelas de este cultivo.

LEGUMINOSAS

GUISANTE

Fenología

Parcelas de seguimiento del cultivo de guisante proteaginoso muy afectadas por las heladas de las últimas semanas, concretamente parcelas del Somontano de Barbastro. En otras zonas comienzan a verse los primeros botones florales.

Plagas

Primeros individuos de Pulgón negro y Sitona en parcelas de seguimiento, con índices por debajo del 10% de plantas afectadas.

FORRAJERAS

Alfalfa

Fenología

Primeros cortes realizados en algunas zonas de Aragón, en el resto se realizarán en las próximas semanas.

Plagas

Presencia de plagas en todas las zonas de seguimiento. Capturas de Gusano verde con conteos de 38 larvas por pase de manga en zonas de Monegros o 27 en la zona más oriental de la Comunidad. Sigue habiendo daños destacables de pulguilla (*Sminthurus viridis*), con el 70% de las plantas dañadas en la Ribera del Ebro, el resto de zonas todas con daños por encima del 10%. Captura de Cuca, (*Colaspidea atrum*) en parcelas de Cinco Villas, Ribera Baja del Ebro o Monegros. En cuanto a *Apion pisi*, presencia generalizada por todas las zonas, con capturas por debajo de los 10 adultos por pase de manga.

