

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 19

FRUTOS SECOS

La presencia de cribado aumenta en el número de parcelas controladas, aunque el porcentaje de daños ocasionados por esta enfermedad se mantiene constante. Comienzan a apreciarse los primeros síntomas de mancha ocre y tanto las capturas de anarsia como la ocupación de pulgón ascienden.

Almendo


Enfermedades

ABOLLADURA

Aunque con las temperaturas que se van a producir en los próximos días la enfermedad frenará su desarrollo, durante la semana 19 se ha visto un aumento de abolladura en las zonas controladas al pasar de un 8,3% de las parcelas afectadas por esta enfermedad a un 28,6%. También la media de brotes dañados ha aumentado al incrementarse los valores de un 2,5 en el anterior informe a un 3,8 en el presente.

CRIBADO

Los síntomas de esta enfermedad en fruto se van generalizando al pasar de estar presentes en un 18,8% de las parcelas a un 33,3% de las mismas. En el caso de las hojas, ocurre lo mismo al apreciarse en un 83,3% de los puntos monitorizados, frente al 75,0% de la semana 17. La media de daños en fruto y en hoja no asciende durante la semana 19.



En la gráfica anterior puede apreciarse la comparativa de la evolución del porcentaje de puntos afectados a lo largo de los tres últimos años.


MANCHA OCRE

Comienzan a observarse los síntomas más tempranos de la enfermedad.

Plagas

ANARSIA

Las capturas de este lepidóptero se generalizan, apareciendo en el 76,9% de los puntos muestreados en altitudes inferiores a 600 m con una media de 14,9 adultos por trampa y semana. En la gráfica siguiente puede observarse la evolución de la plaga a lo largo del tiempo en estas parcelas:



Aunque no se han visto daños en fruto, el porcentaje medio de brotes afectados en estos puntos ha sido del 1,5% producido por larvas de tamaño superior a 3 mm.

En el caso de las parcelas situadas por encima de 600 m de altura, las capturas se han producido en el 66,7% de las mismas, con una media de 1,5 adultos por trampa y semana y sin que se hayan registrado daños ni en brote ni en fruto.

PULGÓN VERDE

Continúa aumentando la presencia de este áfido en las parcelas al encontrarlo en un 46,4% de las puntos monitorizados por la Red en la semana 19 frente a un 25,0% en la 17. El porcentaje medio de ocupación también sigue ascendiendo al pasar de un 3,2% del anterior informe a un 4,1% en el presente.

Zaragoza, 17 de mayo de 2022