



Red Fitosanitaria de Aragón
Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 19

Mayo de 2022

OLIVAR

ESTADO FENOLÓGICO

Fenología

La comarca mas adelantada es el Matarraña donde el 100% esta en estado **D2** (La corola cambia de color), El resto de comarcas se encuentran ya en estado fenológico **D1**(Se forma y predomina la corola).



D1 Se forma y predomina la corola




D2 La corola cambia de color

PRAYS (Prays oleae) Generación antófaga

Las capturas se mantienen altas en todas las zonas, en algunas estaciones de control ya se han alcanzado los máximos de vuelo. La hembra de Prays esta depositando los huevos en las inflorescencias.

Esta semana se ha realizado el conteo de inflorescencias por brote, en todas las comarcas se ha observado un numero bajo o muy bajo de inflorescencias por brote, no superando en ningún caso las 10.

Gráfica capturas Prays en Somontano



ABICHADO (Euzophera pingüis)

Se mantienen las capturas altas. En la comarca del Bajo Aragón de Teruel ya se han observado daños.

BARRENILLO (Phloeotribus scarabaeoides)



Las entradas en los troncos cebo van aumentando, estas se producirán hasta finales de mayo. Se aconseja el triturado de las ramas de poda en el mes de junio. Si se opta por quemarlas, debe hacerse antes del 31 de mayo (con el pertinente permiso y siempre que se permita por parte del **Indice de riesgo por uso de fuego en Aragón**.

BARRENILLO NEGRO (*Hylesinus oleiperda*)

Las larvas están evolucionando en el interior de la ramitas, estando prácticamente todos los individuos en el estado de pupas (transformándose ya en adultos).

Cuando se produzca la salida de adultos del interior de las ramitas se emitirá un aviso fitosanitario para que se traten aquellas parcelas donde se haya detectado el barrenillo.



REPILO (*spilocea oleagina*)

Los índices de Repilo en el control de primavera han salido altos o incluso muy altos en prácticamente todas las estaciones de control, esto es debido a la primavera lluviosa que hemos tenido, debe tratarse antes de floración o en el mes de septiembre cuando las condiciones vuelvan a ser favorables para su desarrollo, con algún fungicida sistémico autorizado.

