Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 29

18 de julio de 2022

CULTIVOS EXTENSIVOS

Semanas marcadas por las altas temperaturas en las cuales comienzan a verse las primeras panículas en el cultivo del arroz, plena floración en el cultivo de maíz y con el cultivo de alfalfa realizado el tercer corte en la mayoría de las zonas.

OLEAGINOSAS

GIRASOL

Fenología

Con la inflorescencia formándose, las hojas comienzan a desplegarse del capítulo, las altas temperaturas favorecen su buen desarrollo.

Plagas

Únicas capturas de Heliothis en Cinco Villas, por debajo de los 15 adultos por trampa y semana. En el resto de las zonas no se tiene constancia de esta plaga en la última semana. Ausencia del resto de plagas en el cultivo de girasol.

FORRAJERAS

Alfalfa

Fenología

Cultivo con buen desarrollo y el tercer corte ya realizado en la mayoría de las zonas.

Plagas

Pulgón negro es la única plaga de las que se tiene constancia en los puntos de seguimiento, con presencia generalizada en todas las zonas, pero por debajo de los umbrales de tratamiento. Máximos en la zona de Barbastro-Monegros con 43 individuos por pase de manga y 30 en la zona Alta de la Ribera del Ebro con gran cantidad de depredadores en la parcela.

CEREAL DE VERANO

MAIZ

Fenología

Cultivo en plena floración en la mayoría de las zonas de Aragón.

Plagas

Disminución importante respecto a semanas pasadas en las capturas de Heliothis (Heliothis armígera), llegando a contabilizar por debajo de 100 individuos por trampa en todas las zonas.

Presencia de *Diabrotica virgigera* en parcela de seguimiento de Monegros, con una captura el 15 de julio.

Descenso en comparación a semanas pasadas en capturas de Mythinma, Ostrinia y Sesania en las parcelas de seguimiento de todas las zonas.

Hasta el momento no se tiene constancia de ácaros sobre el cultivo.

ARROZ

Fenología

Comienzan a versa las primeras plantas en inicio de panícula en la zona del Bajo Cinca, en el resto de las zonas plantas en pleno ahijado.

Plagas

Chilo suppressalis sigue siendo la única plaga de la que se tiene constancia en las parcelas de seguimiento. Capturas por debajo de los 10 adultos por semana y trampa.