Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 31

VIÑEDO

1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO

Según los datos introducidos durante la última semana, todos los puntos de seguimiento han alcanzado al menos el envero. En las zonas por debajo de 600 metros de altitud, todos los puntos están en M2 (50% de envero o más) excepto los que ya están en N1-Maduración. Por encima de los 600 metros sigue habiendo puntos con 10% de envero (más a mayor altitud).



2. PRINCIPALES PLAGAS

A. Polilla del racimo

Solo en cuatro trampas ha habido capturas, correspondiendo tres de ellas a puntos sin confusión sexual, y todas ellas con valores por debajo de un adulto por trampa y día. En ningún punto se han detectado glomérulos en racimo.

B. Piral

Durante la pasada semana solo en tres puntos de la D.O. Cariñena hubo alguna captura, no llegando en ningún caso a un adulto por trampa y día. En ninguno de los puntos se observaron ni larvas ni puestas (ooplacas).

C. Mosquito verde

Durante la pasada semana no ha habido ninguna captura en trampa ni se han detectado individuos en hoja.

D. Araña amarilla

Pese a las aparentes buenas condiciones para el desarrollo de la araña amarilla (altas temperaturas y baja humedad), en los puntos de control no se han observado individuos en hoja ni daños.

3. PRINCIPALES ENFERMEDADES

A. Oídio

En el 6,25% de los puntos de control se observa oídio en hoja. Este porcentaje sube al 13,75% en el caso de oídio en racimo. Fijándonos en las 11 parcelas con oídio en fruto, el 73% presentan menos del 5% de racimos afectados, mientras que el resto (3 parcelas) tienen porcentajes de afección de entre el 15 y el 80% y corresponden a viñas que durante toda la campaña han manifestado la enfermedad, siendo además dos de ellas de la variedad Mazuela. Hay puntos de control con oídio en todas las zonas y en todas las altitudes

B. Mildiu

Solo en algún punto de la D.O. Calatayud ha llovido, sin detectarse de momento ningún síntoma de mildiu ni en hoja ni en racimo. En el resto, las condiciones de humedad no permiten el desarrollo del hongo.

C. Botritis

En ningún punto de la red se ha observado sintomatología alguna.