



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 37

12 de septiembre de 2022

CULTIVOS EXTENSIVOS

OLEAGINOSAS

GIRASOL

Fenología

Gran parte de las parcelas de este cultivo se encuentran con las plantas en el estado de madurez total, adquiriendo sus semillas un color negro.

Plagas

Después de varias semanas sin tener capturas en este cultivo, en la última semana se ha detectado la plaga *Heliothis* en las zonas de Teruel, con capturas por encima de los 20 adultos por trampa y semana.

FORRAJERAS

Alfalfa

Fenología

Con el quinto corte ya realizado en la mayoría de las zonas productoras de alfalfa, el cultivo sigue su buen desarrollo.

Plagas

Disminución importante en el número de pulgones capturados por pase de manga en todas las zonas, niveles inferiores a 10 individuos por pase de manga.

Capturas de orugas sobre este cultivo en la zona de la Ribera Baja del Ebro.

CEREAL DE VERANO

MAIZ

Fenología

Las altas temperaturas de las últimas semanas han aumentado la velocidad de secado de las plantas, las cuales ya tienen muchos de sus granos en el estado de grano semiduro con las plantas de color amarillo.

Plagas

Capturas de *Heliothis* (*Heliothis armígera*) en zonas de Cinco villas, Monegros o Ribera Baja del Ebro, con daños puntuales sobre las parcelas del 20-25% de plantas afectadas.



Mínimas capturas de *Mythinma*, *Ostrinia* y *Sesania* en las parcelas de seguimiento de todas las zonas.

Disminución en el número de Araña roja (*Tetranychus urticae*) en las parcelas de seguimiento, a pesar de ello, todavía los niveles se encuentran con más de 10 individuos por hoja y más de la mitad de las hojas de la planta presentan plaga.

ARROZ

Fenología

Plantas con el grano en el estado de “pastoso blando” en parcela de Cinco Villas mientras que en el Bajo Cinca la mayoría están en el momento de llenado del grano.

Plagas

Parcelas muy puntuales con ataque importantes de Chilo en el Bajo Cinca, con 160 adultos capturados por trampa y semana. El resto de las zonas el nivel de Chilo se mantiene por debajo de las 20 capturas.

Sigue habiendo síntomas de Piricularia en hoja y caña en la zona del Bajo Cinca, con incidencia por debajo del 5% de las plantas afectadas.