



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 2

Enero de 2024

CULTIVOS EXTENSIVOS

El mes de enero ha comenzado con ligeras lluvias y heladas generalizadas en todo Aragón lo que favorece la nascencia y el control de plagas en los cultivos extensivos.

CEREAL DE INVIERNO

Fenología

Desigual estado fenológico en el cereal de invierno en el campo aragonés. En las zonas donde primero se sembró como pueden ser Jacetania y Hoya de Huesa el cereal se encuentra en 3 hojas incluso en inicio de ahijado, mientras que existen otras zonas donde el cultivo está en el momento de nascencia. Las nieblas de las ultimas semanas han favorecido la emergencia de los cultivos.



Plagas

En aquellas parcelas sembradas durante el mes de octubre se han detectado daños ocasionados por Zabro (*Zabrus tenebrioides*), afecciones que no han llegado al 10% de la parcela afectada.



Planta de cereal con daños por zabro

Ausencia del resto de plagas en el cereal de invierno.

OLEAGINOSAS

COLZA

Fenología

El cultivo de la colza se encuentra en estado de roseta (9 hojas) en la mayoría de las parcelas sembradas. Las plantas presentan tonos morados a causa de las bajas temperaturas de los últimos días.

Plagas

Ausencia de plagas en las parcelas de colza

LEGUMINOSAS

Fenología

Como en la campaña pasada, son diversas las parcelas que han sido sembradas de leguminosas, en el caso de Red Fara se realiza el seguimiento de estos cultivos que principalmente son guisantes, veza, habas y yeros. Estos cultivos se encuentran en estados fenológicos que van desde la emergencia de los cotiledones en muchas parcelas hasta el estado de 6 hojas en aquellas parcelas sembradas en otoño.



Cultivo de Guisante

Plagas

Ausencia de plagas en las parcelas de guisante, veza, habas y yeros.