



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 31

Julio de 2024

CULTIVOS EXTENSIVOS

Con la cosecha del cereal de invierno prácticamente acabada en toda la Comunidad, son los cultivos de verano los que requieren un seguimiento tanto de sus estados fenológico como de sus principales plagas. El mes de julio termina con temperaturas altas en todo Aragón y ausencia de lluvias.

OLEAGINOSAS

GIRASOL

Fenología

Primeras plantas en inicio de floración en la comarca de Cinco Villas, mientras en la zona de Teruel las parcelas de girasol se encuentran en plena floración.

Plagas

Heliothis es la única plaga de la que se tiene constancia en las parcelas de girasol, es en la provincia de Teruel donde las capturas llegan a los 50 individuos capturados por trampa y semana.

ALFALFA

Fenología

En la mayoría de las zonas se esta realizando el cuarto corte de este cultivo, temperaturas altas que favorecen el alto crecimiento del cultivo.



Plagas

En los pases de manga que se realizan para monitorizar las plagas sobre este cultivo, son los pulgones la plaga que mas capturas se esta teniendo, pero por debajo del umbral de tratamiento.

Maíz

Fenología

Comienzan a formarse las primeras mazorcas en el cultivo del maíz en las parcelas sembradas en el mes de abril, el resto se encuentran en plena floración y en estado de 6-8 hojas aquellas parcelas sembradas después de la cosecha del cereal de invierno.

Plagas

Se tiene constancia de capturas de adulto de *Diabrotica virgifera* en la zona oriental de la provincia de Zaragoza y Huesca, llegando a capturas 10 adultos por trampa

y semana en la zona de Bujaraloz. Además *Heliothis* sigue siendo la plaga de las que más capturas se está teniendo, aunque el número ha disminuido respecto a semanas pasadas, siendo todavía elevado en la zona alta de la ribera del Ebro.



Oruga de *Heliothis* sobre una planta de maíz

ARROZ

Fenología

Comienzan a formarse las primeras panículas en el cultivo del arroz.

Plagas

Chilo supresalis es la única plaga de las que se están obteniendo capturas, mayoritariamente en la zona del Bajo Cinca.