

## Red Fitosanitaria de Aragón



### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 38

#### VIÑEDO

### 1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO

Los controles realizados la semana 38 reflejan que el 33% de los puntos ya están vendimiados (N.2 Vendimia). El resto, salvo un punto de la zona de CALATAYUD SUR que continúa en M2. Envero (porcentaje de bayas coloreadas superior al 50%), están todos en N1. Maduración.

Aunque la vendimia ya había comenzado en todas las Denominaciones aragonesas, en algunas subzonas coincide que ningún punto de control se ha vendimiado aún (caso de CALATAYUD NORTE y SUR, y BORJA ALTA).



### 2. PRINCIPALES PLAGAS

Todos los controles de **araña amarilla** y **mosquito verde** se han registrado a cero.

**Polilla del racimo:** Solo se ha detectado vuelo en dos puntos sin confusión sexual en CALATAYUD NORTE (Cervera y Aniñón). En ningún punto se contabilizan racimos ocupados.



Racimos en N1. Maduración. Izqda. Tempranillo en CARIÑENA MEDIA; drcha. Cabernet Sauvignon en CARIÑENA ALTA. 17/09/2024.



Cepas vendimiadas (N2. Vendimia. La parcela está vendimiada): izqda. Syrah y drcha. Tempranillo en N1. CARIÑENA MEDIA. 17/09/2024.


### 3. PRINCIPALES ENFERMEDADES

**Oídio:** en el 11% de los puntos controlados no vendimiados se detecta oídio en hoja, y en el 9% en sarmiento y racimo. En todos los puntos con oídio en hoja hay también oídio en racimo y sarmiento. Las variedades de los puntos de control en la que se registra oídio esta semana son Garnacha y Tempranillo.



Cepa con ataque intenso de oídio. Tempranillo en BORJA BAJA. 19/09/2024

**Botritis:** Las lluvias de las últimas semanas han favorecido el desarrollo de botritis. En la semana 36 no se observó ninguna incidencia, pero el alto riesgo de infección ya se ha empezado a ver en algunas viñas de seguimiento. Así, en el 16% de los puntos de control no vendimiados hay botritis en racimo. Los porcentajes oscilan entre el 1 y el 6% de racimos afectados. Se ha visto botritis en puntos de todas las denominaciones excepto en CARIÑENA (seguramente porque la campaña va mucho más avanzada, con lo que muchas viñas susceptibles ya están vendimiadas, y además las Garnachas cuajaron mal por lo que no hay racimos compactos). En cuanto a variedades, hay puntos con afección de Syrah, Tempranillo y Garnacha.



Racimo con botritis. Syrah en BORJA MEDIA. 20/09/2024

**Mildiu:** No se detectan síntomas y solo en la zona de MAELLA se registra que se ha completado ciclo de desarrollo de la enfermedad según el modelo de Goidanich.