



## Red Fitosanitaria de Aragón

### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 4

Enero de 2025

### CULTIVOS EXTENSIVOS

El mes de enero ha comenzado con bajas temperaturas en todo Aragón y lluvias en la cuarta semana del año, condiciones óptimas para favorecer el enraizamiento de los cereales de invierno.

## CEREAL DE INVIERNO

### Fenología

Gran parte de la geografía aragonesa ya se encuentra con los cereales de invierno nacidos, en el estado de 3 hojas los más avanzados y en emergencia en las últimas parcelas sembradas. A diferencia de otros años, comarcas como Jacetania y Alto Gállego se encuentran en los primeros estados fenológicos debido a las siembras retrasadas debido a las lluvias incesantes de los meses de otoño.



## Plagas

Como en años pasados, se siguen encontrando parcelas con daños de *Zabrus tenebroides*, (Zabro) en parcelas de Jacetania, con incidencias del 10% de daños en parcelas. Daños ocasionados tanto en parcelas de laboreo tradicional como de mínimo laboreo.

En aquellas parcelas que se sembraron en las primeras semanas del otoño, antes de las lluvias, se comienzan a observar primeros síntomas de enfermedades fúngicas, principalmente *Helminthosporium* en variedades de cebada en parcelas de Cinco Villas.

Ausencia del resto de plagas importantes en el resto de las zonas.



Síntomas de *Helminthosporium* en cebada

## OLEAGINOSAS

### COLZA

#### Fenología

El cultivo de la colza se encuentra en estado de roseta (9 hojas) en la mayoría de las parcelas sembradas. Las plantas presentan tonos morados a causa de las bajas temperaturas de los últimos días.



## **Plagas**

Ausencia de plagas en las parcelas de colza

## **LEGUMINOSAS**

### **Fenología**

Como en la campaña pasada, son diversas las parcelas que han sido sembradas de leguminosas, en el caso de Red Fara se realiza el seguimiento de estos cultivos que principalmente son guisantes, veza, habas y yeros.

Mayoritariamente ya se encuentran nacidas aquellas parcelas sembradas con estas especies, solamente algunas parcelas de guisantes en regadío se encuentran naciendo.

## **Plagas**

Ausencia de plagas en las parcelas de guisante, veza, habas y yeros.