

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 12

FRUTOS SECOS

Pese a las precipitaciones acaecidas en las últimas semanas, por el momento la incidencia de enfermedades en el cultivo del almendro es mínima. Tan solo han comenzado a apreciarse los primeros síntomas de monilia.

Almendro

Fenología

A lo largo de la semana 12, la fenología predominante en el cultivo del almendro ha sido G. Caída de pétalos, siendo el estado más avanzado H. Fruto cuajado. Los porcentajes de las distintas fenologías en los puntos monitorizados por la Red pueden observarse en la siguiente tabla:

Semana			
	F. Flor abierta	G. Caída de pétalos	H. Fruto cuajado
12	16,0%	60,0%	24,0%

Enfermedades

MONILIA FLORACIÓN

Tan solo el 12,5% de los puntos monitorizados por los técnicos de la Red ha presentado síntomas de esta enfermedad. El porcentaje medio de daños ha sido de un 2% de flores momificadas. Es conveniente recordar que esta enfermedad debe protegerse únicamente en el periodo de floración, ya que es el momento en el que existe riesgo de infección.

Zaragoza, 24 de marzo de 2025

Informe sobre la situación Fitosanitaria. Semana 12/2025

FRUTOS SECOS