

VALORACIÓN DE MATERIAS QUÍMICAS EN EL CONTROL DE *Monilinia* EN MELOCOTÓN EN VALDEJALÓN



CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Objetivo

Estudiar qué materia activa presenta mejores resultados en la lucha contra *Monilinia*

Especie y variedad

Melocotón Sweet Henry

Esquema del ensayo

Parcela elemental de 3 árboles con 4 repeticiones

Tesis estudiadas

1. Testigo (sin tratamiento)
2. Piraclostrobin 6,7% + Boscalida 26,7% WG (2 tratamientos)
3. Hidrogenocarbonato de K 85% SP (1 tratamiento) + *Saccharomyces cerevisiae* 96,1% WG (1 tratam.)
4. Fluopyram 50% SC (2 tratamientos)
5. Mandestrobin 25% SC (2 tratamientos)
6. Piraclostrobin 6,7 + Boscalida 26,7% WG (1 tratam.) + *Saccharomyces cerevisiae* 96,1% WG (1 tratamiento)
7. Mefentrifluconazol 7,5% SC (2 tratamientos)

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Controles

Se contabilizan frutos afectados
144 frutos por tesis

Fechas de tratamientos

01 de agosto de 2024

08 de agosto de 2024

Fechas de controles

19 de agosto de 2024
(recolección)

26 de agosto de 2024
(cámara a 1-1,5°C)

26/08/2024 - 09/09/2024
(temperatura ambiente)

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados

La tesis que mejor ha controlado la monilia ha sido fluopyram 50% SC seguida de mandestrobin 25% SC

Porcentaje de frutos afectados por monilia

