

VALORACIÓN DE MÉTODOS BIOTECNOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE *Ceratitis capitata*



CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Objetivo

Comprobar el efecto que los distintos métodos biotecnológicos registrados producen en el control de *Ceratitis capitata*

Especie y variedad

Melocotón Miraflores: tesis ensayadas
Melocotón Mercil: tesis testigo

Esquema del ensayo

Parcela elemental de 10.560 m² con una única repetición

Trampas

En cada tesis en cada punto cardinal:

- 4 trampas delta de atracción sexual
- 4 mosqueros con atrayente alimenticio


Control semanal (24/06/24 – 06/11/2024)

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Tesis estudiadas

1. Delmur trap (Sarabia)
2. BioMagnet (Suterra)
3. Karate Trap (Syngenta)
4. Kenotrap Complet (Kenogard – Sansan)
5. Ceratipack (SEDQ)
6. Decis trap (Bayer)
7. Testigo


Distribución



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados

El control sobre *C. capitata* es mayor en las zonas estudiadas (distintas tesis + control químico) que en el testigo (únicamente control químico). No existen diferencias significativas entre las distintas tesis.



CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Objetivo

Comprobar el efecto que los distintos métodos biotecnológicos registrados producen en el control de *Ceratitis capitata*

Especie y variedad

Melocotón Miraflores

Esquema del ensayo

Parcela elemental de 10.560 m² con una única repetición

Trampas

En cada tesis (situadas en los distintos puntos cardinales):

- 4 trampas delta de atracción sexual
- 4 mosqueros con atrayente alimenticio


Control semanal (24/06/24 – 06/11/2024)

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Tesis estudiadas

1. Delmur trap (Sarabia)
2. BioMagnet (Suterra)
3. Karate Trap (Syngenta)
4. Kenotrap Complet (Kenogard – Sansan)
5. Ceratipack (SEDQ)
6. Decis trap (Bayer)

Distribución




RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados

No existen diferencias significativas entre las distintas tesis ensayadas en las capturas contabilizadas en las trampas

Capturas de *Ceratitis capitata* en trampa



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados

No existen diferencias significativas entre las distintas tesis ensayadas en las capturas contabilizadas en los mosqueros

Capturas de *Ceratitis capitata* en mosquero

