



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 18

FRUTOS SECOS

Aparecen los primeros síntomas de cribado en fruto mientras que el porcentaje de estos en hoja asciende. Comienza el vuelo de la primera generación de anarsia. La presencia de pulgón en las parcelas de almendro continúa siendo baja al igual que su porcentaje medio de ocupación.

Almendro

Enfermedades

CRIBADO

Los síntomas de esta enfermedad continúan aumentando a lo largo del tiempo, ya que de encontrarse presente en un 46,2% de los puntos controlados por los técnicos de RedFAra en el anterior informe, en el presente se han encontrado daños en un 69,2%. El porcentaje medio de hojas afectadas asciende levemente de un 8,5 a un 8,9% mientras que el de frutos afectados se sitúa en un 3,5%.

Plagas

ANARSIA

A lo largo de la semana 18 este lepidóptero se ha encontrado en un 38,5% de las parcelas monitorizadas. La media de capturas ha sido de 6,6 adultos por trampa y semana. Únicamente se ha encontrado un 1% de brotes dañados en una parcela localizada en la comarca de la Hoya de Huesca, producidos por larvas procedentes del reposo invernal.

PULGÓN VERDE

Este áfido se ha encontrado presente en un 15,4% de los puntos controlados siendo su porcentaje medio de ocupación de un 1,5%. En ninguna de las parcelas se ha encontrado una ocupación superior al 2%.

Zaragoza, 5 de mayo de 2025