



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 24

JUNIO de 2025

OLIVAR

ESTADO FENOLÓGICO

Fenología


El estado predominante es **G Fruto cuajado** en prácticamente todas las comarcas, solamente Somontano y Valdejalón van un poco más atrasado pero ya están la mayoría de las parcelas en fruto cuajado .



G fruto cuajado

BARRENILLO DEL OLIVO (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Ya se han producido las entradas en los troncos cebo, ahora y hasta finales de agosto se producirán las salidas de la nueva generación, durante este mes de junio se pueden triturar los restos de poda que no se quemaron durante el mes de mayo.



Larvas de Barrenillo en el interior del tronco

BARRENILLO NEGRO (*Hylesinus oleiperda*)

Esta semana se ha dado el aviso para el tratamiento contra el barrenillo negro, preferentemente en las comarcas de Campo de Borja y Campo de Belchite que son las mas afectadas.



Adulto de barrenillo negro.

MOSCA DEL OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Ya se han colocado las placas cromáticas, para el seguimiento de la mosca del olivo, durante la campaña [I@s](#) técnicos de las diferentes Atrias de olivar, realizaran el seguimiento de esta plaga y en caso de ser necesario se darán los pertinentes avisos de tratamiento.



Placa cromática con mosca del olivo

PRAYS CARPOFAGA (*Prays oleae*).

Con el estado fenológico de cuajado de fruto empieza la generación carpófaga, con la puesta de huevos en los frutos recién cuajados. La población de Prays es muy dispar de unas parcelas a otras en aquellas donde se alcancen los umbrales sería aconsejable realizar un tratamiento



Huevo de Prays en fruto