

Recomendaciones para el control de plagas de ortópteros

Dociostaurus maroccanus (langosta mediterránea o marroquí)


Calliptamus wattenwylanus (saltamontes)

RECOMENDACIONES

- 1) **LABRADO DEL SUELO EN OTOÑO-INVIERNO PARA DESTRUIR LAS OOTECAS DE AMBAS ESPECIES.** El objetivo es **reducir la población de la siguiente generación destruyendo los huevos.** El labrado debe ser de unos 10 cm de profundidad, desmenuzando el suelo lo más posible. Aunque un volteo valdría, se corre el riesgo de que alguna ooteca permanezca en un cepellón y se conserve intacta.



Recomendaciones para el control de *Dociostaurus maroccanus* (langosta mediterránea)




2) SEGUIMIENTO DE LOS AVIVAMIENTOS Y DE LAS NINFAS RECIEN AVIVADAS.

2.a) Desde finales de abril hacer prospecciones para detectar avivamientos de *D. maroccanus*

2.b) Una vez que se hayan producido los avivamientos registrar los puntos donde se hayan detectado y dar aviso al Centro de Sanidad y Certificación Vegetal (976 71 63 85).

Recomendaciones para el control de *Calliptamus wattenwylanus* (saltamontes)



2) SEGUIMIENTO DE LOS AVIVAMIENTOS DE LAS NINFAS RECIEN AVIVADAS.

- 2.a) Desde finales de mayo hacer prospecciones para detectar avivamientos de *C. wattenwylanus*
- 2.b) Una vez que se hayan producido los avivamientos, registrar los puntos donde se hayan detectado y dar aviso al Centro de Sanidad y Certificación Vegetal (976 71 63 85).