



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 12

FRUTOS SECOS

Durante la pasada semana pudieron observarse síntomas de cribado en hoja y de monilia en floración. Comienzan a apreciarse los primeros individuos de pulgón verde en el cultivo del almendro.

Almendro

Fenología

A lo largo de la semana 12, la fenología predominante en el cultivo del almendro ha sido la más avanzada, H. Fruto cuajado. Los porcentajes de las distintas fenologías en los puntos monitorizados por la Red pueden observarse en la siguiente tabla:

Semana			
	F. Flor abierta	G. Caída de pétalos	H. Fruto cuajado
12	17,9%	35,7%	46,4%

Enfermedades

CRIBADO

Durante la semana 12, el 71,4% de los puntos de almendro controlados por los técnicos de RedFAra han presentado síntomas de esta enfermedad, siendo la media de un 7,6% de hojas afectadas. Hasta el momento no se han localizado daños en fruto.

MONILIA FLORACIÓN

En el 30,4% de los puntos controlados de la Red se han podido observar síntomas de monilia. El porcentaje medio de flores momificadas durante la semana 12 ha sido del 2,1%. Es conveniente recordar que esta enfermedad debe protegerse únicamente en el periodo de floración, ya que es el momento en el que existe riesgo de infección.

Plagas

PULGÓN VERDE

Tan solo se ha localizado presencia de este áfido en un 18,2% de los puntos monitorizados siendo su porcentaje medio de ocupación de un 1,3%.

Zaragoza, 23 de marzo de 2026