



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 16

FRUTOS SECOS

Los daños de cribado en hoja han presentado un incremento a lo largo del tiempo, aunque no se aprecia todavía daño en fruto. Comienzan a observarse ácaros en las parcelas de manera testimonial. De igual forma, se han empezado a encontrar las primeras capturas de anarsia. El porcentaje de ocupación y de parcelas en las que se localiza pulgón verde va en aumento.

Almendro

Enfermedades

CRIBADO

Durante la semana 16, el 50,0% de las parcelas controladas han presentado síntomas de esta enfermedad, siendo la media de un 8,0% de hojas afectadas. Hasta el momento no se han localizado daños en fruto en los puntos vigilados por los técnicos de RedFAra.

Plagas

ÁCAROS

Tan solo se ha observado presencia de ácaros en dos parcelas pertenecientes a las comarcas del Bajo Aragón-Caspe y Bajo Martín a lo largo de la semana 16, ambas con un 1,0% de hojas ocupadas por formas móviles.

ANARSIA

Presente en el 14,3% de las parcelas en las que se monitoriza este lepidóptero, la media de capturas durante la semana 16 ha sido de 3,3 adultos por trampa. Se han encontrado brotes afectados en un 10,7% de los puntos controlados en los que el porcentaje de daño ha oscilado de un 1,0 a un 4,0%. Únicamente una parcela localizada en la comarca del Bajo Martín ha presentado un 1,0% de frutos afectados. En todos los casos anteriores, las larvas encontradas han superado el tamaño de los 3 mm.

PULGÓN VERDE

El porcentaje de parcelas en las que se encuentra este áfido se incrementa, localizándose en un 28,6% de las parcelas controladas por los técnicos de RedFAra. El porcentaje de ocupación media es del 3,3, aunque oscila según parcelas de un 1,0 a un 13,0%.

Zaragoza, 21 de abril de 2026