



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 22

FRUTOS SECOS

Aparecen los primeros síntomas de xanthomonas en fruto. Los daños de cribado y mancha ocre continúan aumentando, al igual que la presencia y la ocupación de pulgón verde y anarsia.

Almendro

Enfermedades

CRIBADO


Los síntomas de cribado han aumentado encontrándose presentes en un 63,6% de las parcelas tanto en el caso del daño en las hojas como en el de los frutos. El porcentaje medio de hojas afectadas ha pasado de un 4,9% en la semana 20 a un 7,6% en la 22. En el caso del porcentaje medio de frutos con daño, estos también se han incrementado al pasar de un 4,0% en el anterior informe a un 9,9% en el presente.

MANCHA OCRE

El porcentaje de parcelas en las que se localizan síntomas de mancha ocre aumenta, al observarse esta enfermedad en un 39,3% de los puntos controlados por los técnicos de la Red, frente al 21,4% de la semana 20.

El porcentaje de hojas afectadas también se incrementa, aunque levemente al pasar de 4,3% en el anterior informe a 4,5% en el presente. En la gráfica siguiente puede apreciarse el avance de la enfermedad a lo largo del tiempo en las cuatro pasadas campañas, así como en la presente.

% hojas afectadas



XANTHOMONAS

Comienzan a apreciarse los primeros síntomas de esta enfermedad. Así, durante la semana 22 se ha apreciado un 8,0% de daño en fruto en un punto de los controlados por los técnicos de RedFAra situado en la comarca Campo de Borja.

Plagas

ÁCAROS

A lo largo de la semana 22 se han observado ácaros en el 26,7% de las parcelas controladas por los técnicos de RedFAra. El porcentaje medio de hojas ocupadas por formas móviles ha sido del 2,8%.

ANARSIA

Presente en el 96,4% de los puntos monitorizados por la Red, las capturas medias de este lepidóptero durante la semana 22 han sido de 27,4 adultos por trampa, aumentando frente a la media de la semana 20 que se situaba en 14,9. Tan solo se ha registrado un 1,0% de daño en brote producido por larvas de tamaño superior a 3 mm en una parcela localizada en la comarca del Bajo Aragón.

PULGÓN VERDE

Durante la semana 22 tanto la presencia como el porcentaje medio de ocupación de este áfido se han incrementado. Presente en el 21,4% de las parcelas controladas, el porcentaje medio de ocupación ha sido del 2,3% frente al 17,9% y 1,8% respectivos de la semana 20.

Zaragoza, 2 de junio de 2026

Informe sobre la situación Fitosanitaria. Semana 22/2026

FRUTOS SECOS