


RedFAra

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 28

VIÑEDO


1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO

Hay varias ATRÍAs que no han hecho controles esta semana por vacaciones de sus técnicos, así que solo hay controles de 72 puntos, quedando CALATAYUD NORTE y CARIÑENA ALTA con apenas representación.

El 79% de los puntos de seguimiento están en L. Cerramiento de racimo, el 17% en M1. 10% Inicio de envero. Algunas bayas comienzan a colorearse, y el 3% en M1. 25% Inicio de envero. Entre el 10 y el 25% de bayas coloreadas.

En 2025 esta misma semana el 94% de los puntos de seguimiento estaban en L. Cerramiento del racimo y el 6% en K. Grano tamaño guisante. Aún no se había registrado envero. La fenología de 2024 era similar a la de 2025, y presentaban un retraso respecto a 2023 de al menos una semana. En 2023 (año con fenología muy adelantada) el primer control en M1. Inicio de envero data del 11/07/2023, lo que supone 8 días de retraso respecto a 2026, en que **el envero se registró por primera vez el 3 de julio**.

La larga e intensa **ola de calor** de principios de julio va a marcar la evolución de la fenología.



Si nos fijamos en las variedades más representadas en REDFARA:

CABERNET SAUVIGNON: todos los puntos están en L. Cerramiento de racimo.

CHARDONNAY: el 60% de los puntos están en L. Cerramiento de racimo, y el 40% en M1. Inicio de envero (la mitad en M1. 10% Inicio de envero y la mitad en M1. 25% Inicio de envero).

GARNACHA: el 90% están en L. Cerramiento de racimo, y el 10% en M1. 10% Inicio de envero. Algunas bayas comienzan a colorearse. Los puntos en los que ya hay envero están en CARIÑENA BAJA, MAELLA y LÉCERA.

MAZUELA: todos los puntos están en L. Cerramiento de racimo.



L. Cerramiento de racimo. Cabernet Sauvignon en Barbastro (SOMONTANO) 09/07/2026



M1. Inicio de envero. Tempranillo en Magallón (BORJA BAJA) 09/07/2026

SYRAH: el 86% están en L. Cerramiento de racimo, y el resto en M1. 10% Inicio de envero. Algunas bayas comienzan a colorearse. Las parcelas más adelantadas se encuentran en la zona BORJA BAJA.

TEMPRANILLO: Predomina M1. Inicio de envero: El 50% en M1. 10% Inicio de envero y el 16,5% en M1. 25%. Inicio de envero. El resto está en L. Cerramiento de racimo.

2. PRINCIPALES PLAGAS

Durante esta semana todos los controles de **araña amarilla y mosquito verde** se han registrado a cero.

Polilla del racimo: ha habido capturas en el único punto que se ha seguido esta semana de CALATAYUD NORTE (5 adulto por trampa y semana), en MAELLA (3 adulto por trampa y semana), y en SOMONTANO (media de 16 adultos por trampa y semana). Salvo en el punto de CALATAYUD NORTE que se observa un descenso importante de capturas respecto a la semana anterior, en el resto de puntos las capturas son muy similares a las de la semana precedente.

Piral: ha habido capturas en el 12,5% de los puntos, situándose todos ellos en la zona de CARIÑENA. Las capturas han oscilado entre 1 y 3 por semana. No se han visto larvas ni ooplacas.

Erinosis: En el 27% de puntos de seguimiento se ha observado erinosis en hoja, y en el 4,5% también en racimo. En el caso de los síntomas en hoja, las afecciones oscilan entre el 1 y el 15% de hojas afectadas, y en el caso de que haya afección en racimo, ésta afecta al 1% de los mismos. Se ha visto erinosis en la mayoría de las variedades y zonas.



Hojas con síntomas de erinosis. Variedad Cabernet Sauvignon. Barbastro (SOMONTANO) 03/07/2026

3. PRINCIPALES ENFERMEDADES

No se han observado síntomas de **botritis** esta semana.

En el caso del **mildiu**, se detectan síntomas en hoja en el 9,7% de los puntos, y síntomas en racimo en el 4%. En esos casos, la media de hojas afectadas ha sido del 5% y de los racimos del 1%. Se detecta en muchas variedades, y en las zonas BORJA BAJA y MEDIA.

Se ha registrado **oídio** en racimo en el 32% de los puntos, en hoja en el 22% y en pámpano en el 19% de los puntos. La afección media ha sido del 10% tanto en hoja como en racimo, y del 12% en pámpano. En la semana 22 solo el 6% de las parcelas tenían oídio en hoja, y el 4,5% en pámpano y racimo. Se observa en cualquier variedad concentrándose los puntos afectados sobre todo en CARIÑENA y BORJA.

4. MALAS HIERBAS

De los 43 puntos de seguimiento con datos de malas hierbas, estas son los datos de las coberturas totales de malas hierbas:

% cobertura	% de puntos
0	56%
1-10	23%
11-50	16%
51-100	5%

La siguiente tabla resume los datos de las malas hierbas detalladas en RedFara:

	Parcelas con presencia de...	Parcelas con presencia de... (%)	Cobertura en parcelas con presencia (%)
Capitana	6	14,0	3,1
Coniza	6	14,0	23,3
Convolvulus	7	16,3	1,9
Diplotaxis	6	14,0	3,5
Engramen	4	9,3	8
Kochia	1	2,3	100
Malva	3	7,0	1,7