


RedFAra

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 31

VIÑEDO


1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO

La fenología predominante es **M2. 90% Pleno envero**. Queda todavía alguna baya **verde**, con el 33% de los puntos en este estado. El 86% de los puntos están en distintos grados de M. Envero (el 14% en **M1. Inicio de envero**, y el 71% en **M2. Pleno envero**), y el 14% en **N1. Maduración**.

En 2025, en la semana 32, el 12% de los puntos estaban en N1. Maduración, y el 14% en M1. Inicio de envero. Se aprecia pues al menos una semana de adelanto respecto a 2025.

Respecto a 2023 también 2026 presenta adelanto: la semana 31 de 2023 el 85% de los puntos estaban en M. Envero, prácticamente igual que en 2026, pero en 2023 aún quedaba un 5% de los puntos en L. Cerramiento del racimo.

En el mes de julio se han sucedido, casi empalmado, las **olas de calor**, mientras que la **ausencia de precipitaciones** ha sido generalizada.



Si nos fijamos en las variedades más representadas en REDFARA:

CABERNET SAUVIGNON: la fenología oscila entre M1. 10% Inicio de envero. Algunas bayas comienzan a colorearse, y M2. 75% Pleno envero. Entre un 50 y un 75% de las bayas coloreadas. El 60% de los puntos están en M1. Inicio de envero, y el 40% en M2. Pleno envero.

CHARDONNAY: el 83% de los puntos están en N. Maduración, y el resto en M1. 10% Inicio de envero.

GARNACHA: la fenología se encuentra entre M1. 10% Inicio de envero. Algunas bayas comienzan a colorearse, y M2. 90% Pleno envero. Queda todavía alguna baya verde. El 14% están en M1. Inicio de envero, y el 86% en M2. Pleno envero.

MAZUELA: todos los puntos están en M2. Pleno envero.

SYRAH: hay puntos desde M1. 10% Inicio de envero. Algunas bayas comienzan a colorearse, hasta N1. Maduración. Todas las bayas coloreadas. El 12,5% están en M1. Inicio de envero, el 62,5% en M2. Pleno envero, y el 25% en N1. Maduración. Las parcelas más adelantadas se encuentran en CARIÑENA.

TEMPRANILLO: Predomina M2. 90% Pleno envero. Queda todavía alguna baya verde (56%), seguido de N1. Maduración (25%). El resto está en M2. Pleno envero (50 ó 75% de bayas coloreadas).



M1. 10% Inicio de envero. Algunas bayas comienzan a colorearse. Garnacha en Paniza (CARIÑENA ALTA) 31/07/2026



N1. Maduración. Tempranillo en Magallón (BORJA BAJA) 31/07/2026

2. PRINCIPALES PLAGAS

Durante esta semana todos los controles de **araña amarilla y piral** se han registrado a cero.

Mosquito verde: No se ha visto ningún síntoma ni ha habido capturas, y solo se han visto individuos en hoja en un punto en MAELLA, con el 2% de las hojas ocupadas.

Polilla del racimo: ha habido capturas de adultos en trampa en casi todos los puntos sin confusión (CALATAYUD SUR, MAELLA y SOMONTANO), sin embargo se han detectado puestas y/o larvas en pocos puntos, dos de ellos en parcelas con confusión. La siguiente tabla recoge los datos obtenidos las semana 31 y las capturas de la semana 30; no todas las parcelas de la misma zona presentan la misma tendencia de la curva de vuelo.

Punto	Semana 30 Adultos/ trampa y semana	Semana 31 Adultos/ trampa y semana	Confusión sexual	Huevos/ 100 racimos	% racimos con puesta	Glomerulos / 100 racimos	% Racimos ocupad os	Zona
Adahuesca	0	15	No	0	0	0	0	SOMONTANO
Castillazuelo	4	5	No	0	0	0	0	SOMONTANO
BARBASTRO j.a.	0	40	No	0	0	0	0	SOMONTANO
BARBASTRO a.m.	15	5	No	0	0	0	0	SOMONTANO
Loma Gorda	0	1	No	0	0	0	0	CALATAYUD NORTE
La Dehesa	0	2	No	0	0	0	0	CALATAYUD NORTE
Las Llanas	8	43	No	7	7	5	5	CALATAYUD NORTE
El Prado	2	31	No	3	3	3	3	CALATAYUD NORTE
Las Martas	1	25	No	3	3	2	2	CALATAYUD NORTE
Aniñón	10	12	No	0	0	0	0	CALATAYUD NORTE
Munébrega	2	0	No	0	0	0	0	CALATAYUD SUR
VI-Val de las Eras	46	22	No	0	0	0	0	MAELLA
Carrambiel	0	0	Sí	40	40	0	0	BORJA BAJA
Simon	0	0	Sí	4	3	5	5	BORJA ALTA



Daños por polilla. Garnacha en Fuendejalón (BORJA BAJA) 31/07/2026



Puesta de polilla. Garnacha en Fuendejalón (BORJA BAJA) 31/07/2026

Erinosis: En el 29% de puntos de seguimiento se ha observado erinosis en hoja, y en el 1,8% también en racimo. En el caso de los síntomas en hoja, las afecciones oscilan entre el 1 y el 72% de hojas afectadas, y en el caso de que haya afección en racimo, afecta al 1% de los mismos. Se ha visto erinosis en la mayoría de las variedades y zonas. En muchos casos las abolladuras ya están marrones por el envés, lo que indica que se trata de afecciones viejas.



Hojas con síntomas de eriosis con la agalla por el envés marrón.
Variedad Merlot. Cariñena (CARIÑENA BAJA) 29/07/2026

3. PRINCIPALES ENFERMEDADES

No se han observado síntomas de **botritis** esta semana.

En el caso del **mildiu**, se detectan síntomas en hoja en el 7,4% de los puntos, y síntomas en racimo en el 4%. En esos casos, la media de hojas afectadas ha sido del 4,5% y de los racimos del 1,3%. Se detecta en muchas variedades, y en las zonas BORJA BAJA y MEDIA. Los valores son prácticamente los mismos que en las semanas anteriores, de lo que se deduce que no hay síntomas nuevos.

Se ha registrado **oídio** en racimo en el 23% de los puntos, en hoja en el 17% y en pámpano en el 18% de los puntos. La afección media ha sido del 17% en hoja, del 19% en racimo, y del 22% en pámpano. Respecto a la semana 28 se observa un descenso de los síntomas en racimo (en esa semana se vio en el 32% de los puntos), lo que es normal porque, en variedades tintas, los indicios leves de la enfermedad dejan de observarse cuando el grano envera. También se observa una disminución en hoja del 22% al 17%, mientras en pámpano (19%) los síntomas se mantienen. La afección media de los puntos con oídio ha aumentado en todos los órganos, puesto que la semana 28 fue del 10% tanto en hoja como en racimo, y del 12% en pámpano, el oídio, lo que podría indicar que pese a las altas temperaturas el oídio se ha seguido desarrollando. Hay viñas con afecciones en pámpano y racimo del 100%. El oídio se observa en cualquier variedad concentrándose los puntos afectados sobre todo en CARIÑENA y BORJA.



Síntomas de oídio en sarmiento y racimo. Variedad Chardonnay. Cariñena (CARIÑENA MEDIA) 31/07/2026

4. MALAS HIERBAS

De los 46 puntos de seguimiento con datos de malas hierbas, estos son los datos de las coberturas totales de malas hierbas:

% cobertura	% de puntos
0	59%
1-10	17%
11-50	17%
51-100	7%

La siguiente tabla resume los registros de las malas hierbas detalladas en RedFAra:

	Parcelas con presencia de...	Parcelas con presencia de... (%)	Cobertura en parcelas con presencia (%)
Capitana	4	8,7	1,8
Coniza	7	15,2	24
Convolvulus	3	6,5	2
Diploaxis	4	8,7	3,5
Engramen	2	4,3	20
Kochia	2	4,3	51
Malva	3	6,5	4,7

Además, en varios puntos se hace referencia a la presencia de otras arvenses como amaranthus, ortiga, estramonio o cardo.