


RedFAra

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 34


VIÑEDO

1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO

La fenología predominante es **N1. Maduración** (79%). El 13% de los puntos ya han sido vendimiados (**N2. Vendimia**), el 8% está en **M2. Pleno envero** (90% y 75% de bayas enveradas). **La vendimia ha empezado con un adelanto de unos 15 días en todas las zonas vitícolas.**

La fenología de la semana 34 en los años anteriores fue la siguiente:

- En 2025 el 60% de los puntos estaban en N1. Maduración y el 8% en N2. Vendimia, estando el resto en M2. Pleno envero.
- En 2024 el 62,5% de los puntos estaban en N1. Maduración, el 29,5% en M. Envero (con distintos porcentajes de bayas coloreadas), el 7% ya habían sido vendimiados, pero aún quedaba algún punto en L. Cerramiento de racimo (1%).



Si nos fijamos en las variedades más representadas en REDFARA:

CABERNET SAUVIGNON: el 80% de los puntos están en N1. Maduración, y el 20% en M2. 90% Pleno envero. Queda todavía alguna baya verde.

CHARDONNAY: todos los puntos han sido ya vendimiados, pues es la primera variedad que se recoge.

GARNACHA: la fenología predominante es N1. Maduración (85%), el 12% está en M2. 90% Pleno envero, y un 3% en N2. Vendimia.

MAZUELA: todos los puntos están en N1. Maduración.

SYRAH: el 17% ya se han vendimiado, y el resto está en N1. Maduración.

TEMPRANILLO: todos los puntos están en N1. Maduración.



M2. 90% Pleno envero. Queda todavía alguna bay: verde. Cabernet en Barbastro (SOMONTANO)
21/08/2026



N2. Vendimia. La parcela está vendimiada. Chardonnay en Barbastro (SOMONTANO)
21/08/2026

2. PRINCIPALES PLAGAS

Durante esta semana todos los controles de **araña amarilla y mosquito verde** se han registrado a cero.

Erinosis: De los puntos en los que aún se controla la erinosis (se mira hasta N1. Maduración), se ha detectado en hoja en el 19% de puntos, con porcentajes de afección entre el 1 y el 12%. En los puntos en los que se detecta, se observa de media en el 4% de las hojas. Se ha encontrado en Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo.

Polilla del racimo: ha habido capturas de adultos en trampa en casi todos los puntos sin confusión de CALATAYUD SUR y MAELLA, y en dos puntos de SOMONTANO. Sin embargo se han detectado puestas y/o larvas en pocos puntos, dos de ellos en parcelas con confusión. La siguiente tabla recoge los datos obtenidos la semana 34 y las capturas de la semana 33 para poder ver la evolución del vuelo: en CALATAYUD NORTE se observa un claro descenso en las capturas; en los puntos de SOMONTANO y MAELLA las capturas han aumentado. La mayor afección en racimo la encontramos en un punto de BORJA ALTA con confusión sexual.

Punto	Semana 33 Adultos/ trampa y semana	Semana 34 Adultos/ trampa y semana	Confusión sexual	Huevos/ 100 racimos	% racimos con puesta	Glomerulos / 100 racimos	% Racimos ocupados	Zona
Adahuesca	2	5	No	0	0	0	0	SOMONTANO
Castillazuelo	1	2	No	0	0	0	0	SOMONTANO
Las Llanas	30	12	No	0	0	2	2	CALATAYUD NORTE
El Prado	22	7	No	0	0	2	2	CALATAYUD NORTE
Las Martas	32	8	No	0	0	0	0	CALATAYUD NORTE
Aniñón	20	11	No	6	2	1	1	CALATAYUD NORTE
VI-Val de las Eras	8	12	No	0	0	0	0	MAELLA
Simón	0	0	Sí	9	5	9	3	BORJA ALTA

3. PRINCIPALES ENFERMEDADES

Botritis: se han visto síntomas en una parcela de Garnacha Blanca en Ainzón (BORJA MEDIA), con el 1% de racimos afectados. Las tormentas de las últimas semanas y la bajada de temperaturas van a favorecer el desarrollo de esta enfermedad.

En el caso del **mildiu**, se detectan síntomas en hoja en el 10% de los puntos, y síntomas en racimo en el 6%. En esos casos, la media de hojas afectadas ha sido del 3,5% y de los racimos del 1,25%. Se detecta en muchas variedades, y en las zonas BORJA BAJA y MEDIA. Los valores son prácticamente los mismos que en las semanas anteriores, de lo que se deduce que no hay síntomas nuevos. El mildiu se controla hasta N1. Maduración.

Se ha registrado **oídio** en racimo en el 17% de los puntos, en hoja en el 9% y en pámpano en el 17% de los puntos. La afección media ha sido del 10% en hoja, del 18% en racimo, y del 19% en pámpano. El oídio se observa en cualquier variedad (Garnacha Tinta y Blanca, Mazuela, Cabernet Sauvignon, Moscatel), concentrándose los puntos afectados sobre todo en CARIÑENA y BORJA. También se detectan síntomas en LÉCERA.